

他の病院、診療所にかかるとき、または薬局でお薬をお求めになるときはこの用紙を見せ てください。

処方日 2015年9月25日

薬袋番号 薬品・用法・用量 情報文章

(1/3)



リスパリドンOD錠2mg「アメル」  
分2 朝・夕食後  
14日分

起床時	朝	昼	夕	就寝前
	1		1	
	錠		錠	

**効能効果**  
精神症状を改善するお薬です。  
不安・緊張・心配等を鎮める薬です。  
**副作用及び使用上の注意**  
眠気、注意力、集中力の低下が起こることがあり、また飲酒にて作用が増強することがあるのでご注意ください。  
自動車の運転等、危険を伴う操作は避けて下さい。

(1/3)




ピペリデン錠1mg  
分2 朝・夕食後  
14日分

起床時	朝	昼	夕	就寝前
	1		1	
	錠		錠	

**効能効果**  
中枢性に抗コリン作用を発揮し過剰活動状態になっているコリン作動性神経を抑制することで特発性、その他(脳炎後、動脈硬化性、中毒性)のパーキンソニズム向精神薬投与によるパーキンソニズム・ジスキネジア(遅発性を除く)・アカシアに効果があります。  
**副作用及び使用上の注意**  
口渇、嘔吐、胃部不快感、食欲不振、幻覚、不安、発疹、排尿困難、気分高揚など

(2/3)



アスレミン配合細粒  
分3 朝・昼・夕食後  
14日分

起床時	朝	昼	夕	就寝前
	0.5	0.5	0.5	
	g		g	

**効能効果**  
胃の粘膜を保護する薬です。

(3/3)



フルニトラゼハム錠1mg「アメル」  
分1 就寝前  
14日分

起床時	朝	昼	夕	就寝前
				1
	錠			

**効能効果**  
寝つきをよくし、夜間の睡眠を持続させる薬です。  
**副作用及び使用上の注意**  
眠気、注意力、集中力の低下が起こることがあり、また飲酒にて作用が増強することがあるのでご注意ください。  
自動車の運転等、危険を伴う操作は避けて下さい。

お薬は直射日光、熱、湿気をさけて保存して下さい。

◆上記の薬の作用は一般的なものであって、症状によっては異なる使われ方もあります。

◆お薬についてご不明な点がございましたら、主治医又は、薬剤師にご相談下さい。

さっぽろ香雪病院 薬局  
札幌市清田区真栄319  
TEL 011-884-6878

薬剤師